

**ORTHOBANC, LLC PLAN DE
PAGO RECURRENTE**

Orthodontist

McKinney Orthodontics PC

Cuenta # _____

Nombre del Responsable:	Nombre De Paciente:
Direccion responsable:	Responsable SSN:
Ciudad, Estado,Codigo postal:	Correo Electronico:
Casa #:	Cumpleanos de Paciente :
Movil #:	Trabajo #:

Amount of Total Withdrawal	Monthly Payment Amount	Final Payment Amount	Total Number of Monthly Withdrawals	Fecha de inicio del retiro		
				Mes	Día	Ano
					5 12 19 26	

Seleccione las cuentas primarias y secundarias que OrthoBanc debe cargar:

Cuenta principal	Cuenta secundaria
<input type="checkbox"/> Checking * <input type="checkbox"/> Savings <hr/> Nombre (s) tal y como aparecen en su cuenta <hr/> Cuenta de Banco# Routing #	<input type="checkbox"/> Checking * <input type="checkbox"/> Savings <hr/> Nombre (s) tal y como aparecen en su cuenta <hr/> Cuenta de Banco# Routing #
<input type="checkbox"/> Credit Card * Tipo De Tarjeta _____ Tarjeta De Credito # _____ Fecha De Experacion _____	<input type="checkbox"/> Credit Card * Tipo De Tarjeta _____ Tarjeta De Credito # _____ Fecha De Experacion _____

ORTHOBANC, LLC EFT AUTHORIZATION

Por la presente autorizo a OrthoBanc, LLC (en adelante denominado "OrthoBanc"), en nombre del ortodoncista, a iniciar las entradas de débito en la cuenta(S) indicado (s) anteriormente (de los cuales soy firmante autorizado) a través de transferencia electrónica de fondos (EFT). Entiendo que a partir de la fecha indicada arriba, OrthoBanc comenzará los retiros de mi cuenta bancaria o de tarjeta de crédito. Dichos retiros continuarán cada mes hasta que el saldo total, proporcionado por Orthodontist a OrthoBanc, sea pagado en su totalidad. Entiendo que OrthoBanc sea pagado en su totalidad. Entiendo que OrthoBanc está debitando fondos de mi cuenta para el pago al ortodoncista, por los servicios profesionales prestados, y que el nombre OrthoBanc puede / aparecerá en mi estado mensual. Entiendo que mi pago final puede ser un poco más o menos que el monto de pago mensual que se menciona anteriormente, pero no excederá el saldo de la cuenta. Si el ortodoncista necesita reducir la cantidad de débito, el ortodoncista puede notificar a OrthoBanc para reducir el pago sin notificación a mí.

También acepto que si OrthoBanc es notificado de que no hay fondos disponibles en mi cuenta bancaria (NSF, cuenta cerrada, etc.) o que un cargo a mi tarjeta de crédito se le niega, una tarifa de \$ 25 será cobrada por OrthoBanc. Estoy de acuerdo en que si los fondos no están disponibles en la cuenta que escojo como primaria, OrthoBanc puede intentar obtener fondos de mi cuenta secundaria. Si no se proporciona ninguna cuenta secundaria, OrthoBanc puede volver a redactar mi cuenta principal. Entiendo que si elijo suspender este método de pago, debo notificar a OrthoBanc un mínimo de 7 días antes de mi

Fecha de débito programada. También autorizo a OrthoBanc a ponerse en contacto conmigo en cualquiera de los números de teléfono mencionados anteriormente.

Firma: _____

Fecha: _____

For Provider use only:	
OID/PID Number: of00004166/op00005717	Patient OrthoBanc Ref No:

2835 Northpoint Blvd, Hixson, TN 37343

P: 888-758-0585 F: (888) 758-0586

www.orthobanc.com

RPP - Revision Date Sept - 15

Paciente

Alergias

Ocasionalmente, los pacientes pueden ser alérgicos a algunos de los materiales componentes de sus aparatos ortodónticos. Esto puede requerir un cambio en el plan de tratamiento o la interrupción del tratamiento antes de completarse. Aunque muy poco común, el manejo médico de las alergias de los materiales dentales puede ser necesario.

Problemas generales de salud

Los problemas generales de salud, como los trastornos óseos, sanguíneos o endocrinos, y muchos medicamentos recetados y no recetados (incluyendo bisfosfonatos) pueden afectar su tratamiento ortodóntico. Es imperativo que usted informe a su ortodoncista de cualquier cambio en su estado general de salud.

Uso de productos de tabaco

Se ha demostrado que fumar o masticar tabaco aumenta el riesgo de enfermedad de las encías e interfiere con la curación después de la cirugía oral. Los usuarios de tabaco también son más propensos al cáncer oral, la recesión de las encías y el retraso en el movimiento de los dientes durante el tratamiento ortodóntico. Si usa tabaco, debe considerar cuidadosamente la posibilidad de un resultado ortodóntico comprometido.

Dispositivos de anclaje temporales

Su tratamiento puede incluir el uso de un (los) dispositivo (s) de anclaje temporal (es decir, tornillo metálico o placa unida al hueso). Existen riesgos específicos asociados con ellos. Es posible que el tornillo o tornillos se puedan soltar, lo que requeriría su extracción y posiblemente su reubicación o reemplazo con un tornillo más grande. El tornillo y el material relacionado pueden caerse accidentalmente. Si el dispositivo no puede estabilizarse durante un período de tiempo suficiente, puede aplicarse un plan de tratamiento alternativo. ser necesario.

Es posible que el tejido alrededor del dispositivo pueda inflamarse o infectarse, o que el tejido blando pueda crecer sobre el dispositivo, lo que también podría requerir su eliminación, escisión quirúrgica del tejido y / o el uso de antibióticos o enjuagues antimicrobianos.

Es posible que los tornillos se pudieran romper (es decir, inserción o extracción). Si esto ocurre, la pieza rota puede dejarse en la boca o puede ser extirpada quirúrgicamente. Esto puede requerir la remisión a otro especialista dental.

Al insertar el (los) dispositivo (s), es posible dañar la raíz de un diente, un nervio o perforar el seno maxilar. Por lo general, estos problemas no son significativos; Sin embargo, puede ser necesario un tratamiento dental o médico adicional.

El anestésico local puede utilizarse cuando estos dispositivos se insertan o eliminan, lo cual también tiene riesgos. Por favor, avise al médico que coloca el dispositivo si ha tenido alguna dificultad con los anestésicos dentales en el pasado.

Si alguna de las complicaciones mencionadas anteriormente ocurre, una referencia puede ser necesaria a su dentista de la familia u otro especialista dental o médico para el tratamiento adicional, honorarios para estos servicios no se incluyen en el coste para el tratamiento ortodóntico.

Iniciales del paciente o padre

RECONOCIMIENTO

Reconozco por este medio que he leído y entiendo completamente las consideraciones y los riesgos del tratamiento presentados en este formulario. También entiendo que puede haber otros problemas que ocurren con menos frecuencia que los presentados, y que los resultados reales pueden diferir de los resultados esperados. También reconozco que he discutido este formulario con el (los) ortodoncista (s) abajo firmado (s) y se me ha dado la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Se me ha pedido que haga una elección sobre mi tratamiento. Por la presente doy mi consentimiento al tratamiento propuesto y autorizo al ortodoncista indicado a continuación para proporcionar el tratamiento. También autorizo al ortodoncista (s) a proporcionar mi información de atención médica a mis otros proveedores de atención médica. Entiendo que mi tarifa de tratamiento cubre solamente el tratamiento proporcionado por el ortodoncista (s), y que el tratamiento proporcionado

Por otros profesionales dentales o médicos no está incluido en la tarifa para mi tratamiento ortodóntico.

Firma del Paciente / Padre Fecha

Firma del Ortodoncista Fecha

Testigo Fecha

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO ORTODONCTICO

Por la presente consiento en la elaboración de los registros de diagnóstico, incluidos los rayos X, antes, durante y después del tratamiento ortodóntico y al médico o los médicos mencionados y, en su caso, al personal que preste el tratamiento ortodóntico prescrito por el médico Por encima del individuo. Comprendo completamente todos los riesgos asociados con el tratamiento.

AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Por la presente autorizo al (a los) médico (s) anterior (es) a proporcionar a otros proveedores de atención médica información sobre el cuidado ortodóntico del individuo arriba considerado como apropiado. Entiendo que una vez que se publicó, el doctor (s) y el personal anterior (s) no tiene ninguna responsabilidad de cualquier liberación adicional por el individuo que recibe esta información.

Fecha

CONSENTIMIENTO PARA USO DE REGISTROS

Doy mi permiso para el uso de registros ortodónticos, incluyendo fotografías, hechas en el proceso de exámenes, tratamiento y retención para fines de consultas profesionales, investigación, educación o publicación en revistas profesionales.

Firma Fecha

Testigo Fecha

Tengo la autoridad legal para firmar esto en nombre de

Nombre De Paciente

Relacion a el Pac

Notas

Blank lined area for notes.

Resultados del Tratamiento

El tratamiento ortodóncico se desarrolla normalmente según lo planeado, y tenemos la intención de hacer todo lo posible para lograr los mejores resultados para cada paciente. Sin embargo, no podemos garantizar que usted estará completamente satisfecho con sus resultados, ni se pueden anticipar complicaciones o consecuencias. El éxito del tratamiento depende de su cooperación para mantener las citas, mantener una buena higiene bucal, evitar aparatos sueltos o rotos y seguir las instrucciones del ortodoncista con cuidado.

Duración del tratamiento

La duración del tratamiento depende de una serie de cuestiones, incluyendo la gravedad del problema, el crecimiento del paciente y el nivel de cooperación del paciente. El tiempo de tratamiento real suele estar cerca del tiempo de tratamiento estimado, pero el tratamiento puede alargarse si, por ejemplo, se produce un crecimiento inesperado, si hay hábitos que afectan las estructuras dentofaciales, si se presentan problemas periodontales u otros problemas dentales o si la cooperación del paciente no es adecuado. Por lo tanto, pueden ser necesarios cambios en el plan de tratamiento original. Si el tiempo de tratamiento se extiende más allá de la estimación original, los honorarios adicionales pueden ser evaluados.

Incomodidad

La boca es muy sensible por lo que puede esperar un período de ajuste y algunas molestias debido a la introducción de aparatos ortodóncicos. Medicamentos sin receta para el dolor pueden ser usados durante este período de ajuste.

Recaída

El tratamiento ortodóncico completado no garantiza dientes perfectamente rectos para el resto de su vida. Se requerirá que los retenedores mantengan sus dientes en sus nuevas posiciones como resultado de su tratamiento ortodóncico. Usted debe usar sus retenedores según las instrucciones o los dientes pueden cambiar, además de otros efectos adversos. El desgaste regular del retén es a menudo necesario durante varios años después del tratamiento ortodóncico. Sin embargo, los cambios después de ese tiempo pueden ocurrir debido a causas naturales, incluyendo hábitos como empuje de la lengua, respiración oral y crecimiento y maduración que continúan a lo largo de la vida. Más adelante en la vida, la mayoría de la gente verá sus dientes cambiar. Pueden ser aceptadas irregularidades menores, particularmente en los dientes delanteros inferiores. Algunos cambios pueden requerir tratamiento ortodóncico adicional o, en algunos casos, cirugía. Algunas situaciones pueden requerir retenedores no removibles u otros aparatos dentales hechos por su dentista familiar.

Extracciones

Algunos casos requerirán la extirpación de dientes caducos (dientes) o dientes permanentes. Hay riesgos adicionales asociados con la eliminación de los dientes que debe discutir con su dentista familiar o cirujano oral antes del procedimiento.

Cirugía Ortognática

Algunos pacientes presentan desarmonías esqueléticas importantes que requieren tratamiento ortodóncico junto con cirugía ortognática (dentofacial). Hay riesgos adicionales asociados con esta cirugía que debe discutir con

su oral y / o maxilofacial Antes de comenzar el tratamiento ortodóncico. Tenga en cuenta que el tratamiento ortodóncico antes de la cirugía ortognática a menudo sólo alinea los dientes dentro de los arcos dentales individuales. Por lo tanto, los pacientes sin continuar el tratamiento ortodóncico sin completar los procedimientos quirúrgicos planificados pueden tener una maloclusión peor que cuando comenzaron el tratamiento!

Decalcificación y Dental

Caries Una excelente higiene oral es esencial durante el tratamiento ortodóncico, al igual que las visitas regulares al dentista de su familia. Una higiene inadecuada o inadecuada podría dar lugar a cavidades, dientes descoloridos, enfermedad periodontal y / o descalcificación. Estos mismos problemas pueden ocurrir sin el tratamiento ortodóncico, pero el riesgo es mayor para un individuo que usa frenos u otros aparatos. Estos problemas pueden agravarse si el paciente no ha tenido el beneficio de agua fluorada o su sustituto, o si el paciente consume bebidas o alimentos azucarados

Reabsorción radicular

Las raíces de los dientes de algunos pacientes se vuelven más cortas (reabsorción) durante el tratamiento ortodóncico. No se sabe exactamente qué causa la reabsorción de la raíz, ni es posible predecir qué pacientes experimentarán. Sin embargo, muchos pacientes han retenido los dientes a lo largo de la vida con raíces severamente acortadas. Si la reabsorción se detecta durante el tratamiento ortodóncico, su ortodoncista puede recomendar una pausa en el tratamiento o la eliminación de los aparatos antes de la finalización del tratamiento ortodóncico.

Daño en el nervio

Un diente que ha sido traumatizado por un accidente o decaimiento profundo puede haber experimentado daños en el nervio del diente. El movimiento dentario ortodóncico puede, en algunos casos, agravar esta condición. En algunos casos, el tratamiento del conducto puede ser necesario. En casos severos, el diente o los dientes pueden perderse.

Enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal (de la encía y del hueso) puede desarrollarse o empeorar durante el tratamiento ortodóncico debido a muchos factores, pero más a menudo debido a la falta de higiene bucal adecuada. Usted debe tener a su dentista general, o si está indicado, un periodoncista vigilar su salud periodontal durante el tratamiento de ortodoncia cada tres a seis meses. Si los problemas periodontales no pueden ser controlados, el tratamiento ortodóncico puede tener que interrumpirse antes de completarse.

Lesiones de aparatos ortodóncicos

Deben evitarse las actividades o alimentos que puedan dañar, aflojar o desalojar aparatos ortodóncicos. Los aparatos ortodóncicos sueltos o dañados pueden ser inhalados o tragados o podrían causar otros daños al paciente. Usted debe informar a su ortodoncista de cualquier síntoma inusual o de cualquier aparato suelto o roto tan pronto como sea notado. Daño al esmalte de un diente o a una restauración (corona, unión,

Chapa, etc.) es posible cuando se eliminan los aparatos de ortodoncia. Este problema puede ser más probable cuando se han seleccionado aparatos estéticos (claros o de color de dientes). Si se produce un daño en un diente o una restauración, puede ser necesario restaurar el diente o los dientes afectados por su dentista.

Sombreros

Los cascos de ortodoncia pueden causar lesiones al paciente. Las lesiones pueden incluir daños en la cara o los ojos. En caso de lesión o especialmente una lesión en los ojos, por menor que sea, se debe buscar ayuda médica inmediata.

Abstenerse de usar sombreros en situaciones en las que pueda haber una posibilidad de que pueda ser desalojado o arrancado. Las actividades deportivas y los juegos deben ser evitados cuando se usan sombreros de ortodoncia.

Disfunción articular temporomandibular (mandíbula)

Pueden presentarse problemas en las articulaciones de la mandíbula, es decir, en las articulaciones temporales mandibulares (ATM), que causan dolor, dolores de cabeza o problemas de oído. Muchos factores pueden afectar la salud de las articulaciones de la mandíbula, incluyendo el trauma del pasado (golpes a la cabeza o la cara), artritis, tendencia hereditaria a los problemas de las articulaciones de la mandíbula, excesiva molienda de dientes o apretamiento, mordedura mal equilibrada y muchas condiciones médicas. Los problemas articulares de la mandíbula pueden ocurrir con o sin tratamiento ortodóncico. Cualquier síntoma de las articulaciones de la mandíbula, incluyendo dolor, sacudida de la mandíbula o dificultad para abrir o cerrar, debe ser reportado inmediatamente al ortodoncista. El tratamiento de otros especialistas médicos o dentales ser necesario.

Dientes impactados, anquilosados, no erupcionados

Los dientes pueden verse impactados (atrapados debajo del hueso o las encías), anquilosados (fusionados con el hueso) o simplemente no entrar en erupción. A menudo, estas condiciones se producen sin razón aparente y generalmente no se puede anticipar. El tratamiento de estas afecciones depende de la circunstancia particular y de la importancia general del diente involucrado, y puede requerir extracción, exposición quirúrgica, trasplante quirúrgico o reemplazo protésico.

Ajuste Oclusal

Usted puede esperar imperfecciones mínimas en la forma en que sus dientes se encuentran después del final del tratamiento. Un procedimiento de equilibrio oclusal puede ser necesario, que es un método de molienda utilizado para afinar la oclusión. También puede ser necesario eliminar una pequeña cantidad de esmalte entre los dientes, con lo que "aplanar" las superficies con el fin de reducir la posibilidad de una recaída.

Resultados no ideales

Debido a la amplia variación en el tamaño y la forma de los dientes, dientes perdidos, etc.) puede no ser posible el logro de un resultado ideal (por ejemplo, cierre completo de un espacio). Pueden indicarse tratamientos dentales restauradores, tales como unión estética, coronas o puentes o terapia periodontal. Se le anima a preguntarle a su ortodoncista ya su familia sobre el cuidado adjunto.

Terceros Molares

A medida que se desarrollan los terceros molares (dientes del juicio), sus dientes pueden cambiar la alineación. Su dentista y / o el ortodoncista debe monitorearlos para determinar cuándo, y si los terceros molares necesitan ser removidos.

Continúa en la siguiente página

Iniciales del paciente o del

padre _____

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No hay relación entre la cuota mensual por servicios ortodónticos y las visitas mensuales. Dos o doce semanas pueden transcurrir entre las visitas. Todos los pagos son debidos el primer de cada mes. Además, el número de pagos no se correlaciona con la duración del tratamiento. Los pagos pueden continuar después de que los tirantes hayan sido removidos para cumplir con el contrato.

Todas las cuentas que se convierten en delincuentes de treinta días están sujetas a un cargo de servicio del 1,5% por mes sobre la cantidad vencida. Esta es una tasa porcentual anual del 18%. El tratamiento será descontinuado y los electrodomésticos serán removidos si las cuentas llegan a ser más de 60 días de morosidad.

Cualquier porción de la tarifa de tratamiento no pagada por la compañía de seguros será su responsabilidad. Debe entenderse que USTED (no su compañía de seguros) es responsable de la tarifa completa de ortodoncia. Estaremos encantados de ayudarlo a reclamar sus beneficios de ortodoncia a través de su plan de seguro, como se indica en otro lugar con respecto a las pólizas de seguro en nuestra oficina. Si la compañía de seguros se convierte en sesenta días de morosidad, inmediatamente se hará responsable de la cantidad en mora y será reembolsado, si y cuando, la compañía de seguros hace el pago. Tenga en cuenta: estamos felices de presentar inicialmente las reclamaciones necesarias, pero los demás problemas, cambios y no pago de su compañía de seguros serán su responsabilidad.

INICIAL _____

Esta tarifa no incluye cargos realizados por su dentista. (Limpieza, radiografías, extracciones, etc.)

Se incluye un juego de retenedores. Las exclusiones son el costo de reemplazo para aparatos perdidos o rotos, productos para el cuidado del hogar, llaves o aparatos rotos excesivos y tiempo de tratamiento extendido.

En el caso de que se establezcan procedimientos de cobranza, acepto pagar todos los gastos de recaudación, incluidos los costos judiciales y un honorario razonable de abogado, si se incurre en ello. Entiendo y estoy de acuerdo en que esto ocurrirá en Tuscaloosa o en el Condado de Madison y renunciaré a cualquier derecho a defender esta acción en otro lugar.

INICIAL _____

VISITANDO A SU DENTISTA

Entiendo que durante el tratamiento ortodóntico, las visitas regulares a mi dentista son una parte esencial del tratamiento del paciente ortodóntico. Estas visitas pueden ser necesarias cada 3-6 meses dependiendo de la recomendación del Dr. McKinney, el dentista o el higienista. Las visitas dentales regulares son necesarias para las limpiezas junto con la detección de cavidades o problemas de huesos y encías.

Ciertos problemas, como cavidades o pérdida de hueso, sólo pueden ser evaluados por radiografías especiales tomadas en la oficina del dentista. Entiendo que pueden ocurrir daños en los dientes, hueso y tejido de las encías si no se mantienen visitas dentales regulares. También entiendo que las limpiezas y el diagnóstico para las caries y la enfermedad periodontal no son parte del servicio proporcionado por McKinney Orthodontics o cualquier empleado de la práctica.

También entiendo que el Dr. McKinney tiene el derecho de quitar las llaves antes de que el tratamiento ortodóntico se complete si el paciente no está manteniendo visitas dentales regulares o si el Dr. McKinney siente que el daño adicional ocurrirá a los dientes si los apoyos se dejan en su lugar. Por favor, inicialice si entiende la información mencionada anteriormente.

INICIAL _____

USO DIARIO DEL FLUORURO

Es muy importante que, además de cepillarse al menos 3 veces al día durante 2 minutos y usar hilo dental una vez al día, se use un fluoruro todas las noches antes de ir a la cama. Esta es una recomendación de la Asociación Americana de Ortodontistas basada en años de investigación. El fluoruro ayuda a proteger los dientes y matar las bacterias que pueden causar la descalcificación (destrucción del diente). Sin el uso de este fluoruro, el riesgo de daño dental aumenta, dando lugar a manchas blancas, cicatrices o cavidades en los dientes. Asegúrese de que el uso de este fluoruro no se interrumpa durante el tratamiento ortodóntico. El flúor no es un sustituto de un buen cepillado, pero es un compañero de un buen cepillado. Si el fluoruro recomendado no está siendo usado correctamente y el Dr. McKinney siente que puede ocurrir daño adicional a los dientes si el tratamiento continúa, el Dr. McKinney tiene el derecho de quitar los brackets antes de completar el tratamiento ortodóntico. Inicie por favor si entiende la información enumerada arriba.

INICIAL _____

CERTIFICO, por la presente, que he leído y recibido una copia de la declaración de divulgación anterior _____ Día de _____, y de acuerdo con los términos de la misma.

Firma: _____ SS# _____ Relacion _____

Imprimir nombre: _____

Políticas de la Oficina

Citas Perdidas

Las citas se programan con base en algo llamado "Tiempo de Doctor". Esto básicamente significa que se ha determinado, basado en el tipo de cita, cuánto tiempo es requerido por el ortodoncista y cuánto tiempo es requerido por el asistente de ortodoncia para atender las necesidades del paciente. A pesar de que cada silla está llena, el ortodoncista nunca está programado para estar en dos lugares al mismo tiempo. A veces nos preguntan si podemos apretar a alguien, pero esto no funciona porque un paciente no programado que se inserta en el calendario causará un atasco de tráfico que resultaría en otra persona esperando 15-30 minutos para su cita programada.

Por esta razón, si pierde una cita, a menos que tengamos una apertura debido a una cancelación, podría ser hasta 4-5 semanas antes de que otra cita estará disponible. Si necesita ser visto antes de esto, por lo general podemos hacer arreglos para verle durante las horas de escuela cuando no vemos tantos pacientes. Además, si usted deja nuestra oficina sin hacer una cita, es posible que no tengamos una apertura durante el tiempo que el médico quería ver al paciente. Como puede ver, las citas perdidas pueden resultar en prolongar el tratamiento del paciente.

Por esta razón, si pierde una cita, a menos que tengamos una apertura debido a una cancelación, podría ser hasta 4-5 Sumanas antes de que otra cita estará disponible. Si necesita ser visto antes de esto, por lo general podemos hacer arreglos para verle durante las horas de escuela cuando no vemos tantos pacientes. Además, si usted deja nuestra oficina sin hacer una cita, es posible que no tengamos una apertura durante el tiempo que el médico quería ver al paciente. Como puede ver, las citas perdidas pueden resultar en prolongar el tratamiento del paciente.

Tardanza

Nuestra oficina se esfuerza por ver a todos nuestros pacientes en los horarios establecidos. A veces, nos quedamos atrás sin razones obvias. A veces un padre requiere tiempo adicional para la explicación o un paciente requiere instrucciones adicionales de cepillado de dientes. Usted ve, tratamos de no dejar que nadie salga de nuestra oficina sin saber lo que ha ocurrido durante la visita y también queremos asegurarnos de que los pacientes están haciendo un trabajo adecuado de cuidar de sus dientes. Hemos trabajado estas circunstancias en nuestro horario para que el horario pueda permanecer bastante cerca de estar a tiempo.

Si un paciente es programado para una cita de 3:00 y no llega hasta las 3:15 o más tarde, puede que no sea posible verlos. Nuestras citas están programadas en intervalos de 15 y 30 minutos y ver a este paciente significaría que alguien más que llegó a tiempo no pudo ser visto a su hora designada. Si viendo al paciente fallecido hace que otros pacientes sean vestas tarde, le pediremos que se vuelva a programar la cita. Por supuesto, si hay alguna posibilidad de ver al paciente, lo haremos. No queremos molestar a nadie. Si piensa que va a llegar tarde, llámenos y veremos qué podemos hacer por usted.

Frenitos Quebrados

Los aparatos rotos son parte del tratamiento ortodóncico. Va con el territorio. A veces el paciente ha recibido un traumatismo en la boca o tal vez sólo decidió que no le haría daño a engañar un poco en la "En La Lista De Cosas De No Comer". El paciente promedio romperá un soporte durante su curso de tratamiento. A veces, los brackets se soltarán mientras el paciente está sentado, pero esto sólo ocurre si la llave ya se ha aflojado un poco antes, pero no se ha liberado completamente del diente.

Entendemos y no nos enojamos por ello. Pero, queremos que usted sepa que los corchetes rotos resultarán en un retraso en el tratamiento. También queremos que sepa que cualquier cita que involucre la colocación de frenos debe hacerse durante las horas de escuela. Esta es una cita larga que no se puede hacer antes o después de la escuela, ya que todo el mundo quiere ser visto en este momento. A TODOS los pacientes se les requerirá rotar las citas de la tarde después de la escuela o el trabajo, permitiendo a todos los pacientes la oportunidad de aprovechar periódicamente estos tiempos.

INICIAL _____

También, dejamos a los pacientes saber que los primeros 5 frenos rotos (5 veces la rotura normal) están en nosotros. Después de eso, habrá un cargo de \$ 50.00 por cada soporte adicional roto. Les haremos saber cada vez que un soporte o banda esté roto y cuántos más regalos tienen antes de que tengan que pagar por la cita. Los corchetes quebrados son también la razón número uno que nos atrasan en nuestro horario así que por favor llame con anticipación para hacernos saber si uno de sus frenitos Está roto para que podamos trabajar la reparación en nuestro horario.

Visitas y limpiezas dentales.

Nuestra oficina estara revisando cavidades durante la visita de los pacientes a nuestra oficina a menos que sea muy obvio sin el uso de radiografias. Por eso es importante que el paciente consulte a su dentista cada 4-6 meses para limpiezas y chequeos.

Algunas oficinas dentales piden que los pacientes se presenten a su oficina con los cables ortodonticos eliminados para que el higienista puede hacer un mayor trabajo de trabajar alrededor de los aparatos ortopedicos. Algunas oficinas tienen equipo especial que no requiere que los cables sean removidos. Si su dentista solicita que el cable sea removido, tendremos que hacer arreglos con usted para que el paciente sea visto en nuestra oficina antes y despues de la cita de limpieza.

Vamos a tratar de hacer lo más conveniente para usted como sea posible. Tambien, necesitamos saber por lo menos 6 semanas por adelantado de modo que podamos coordinar y programar las citas apropiadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo me duelen los dientes?

Espere que los dientes sean algo tiernos los primeros dias despues de que sus tirantes esten ajustados. Tome lo que usted toma normalmente para un dolor de cabeza o un alivio. Los dientes no te molestara a menos que trate de comer con ellos, pero no te molestan mientras que haces otras cosas. Lo mas rapido que empiece a masticar, mas rapido ajustara.

¿Mas fluoruro?

Usted necesitara utilizar enjuague con fluor cada noche. Sabemos que usted probablemente tiene fluoruro en su pasta de dientes, pero esto es diferente. Esto protegera su boca en la noche mientras que usted esta durmiendo. Es muy importante y ayudara a evitar las manchas blancas que pueden formarse en los dientes si no se cepillan correctamente. Esto ayuda si usted esta siguiendo nuestra dieta y permanecer lejos de los refrescos, que son muy acidos y llenos de azucar. Recuerde, son sus dientes, por favor cuídese de ellos. Cuando su enjuague con fluor se acaba, puede comprar enjuague de Act o Colgate phos flur.

¿El interior de mis labios estará dolorido para siempre?

Espere, de vez en cuando, que sus mejillas y labios se irriten. Usted acabara acumulando un insensible. Si se forma una ulcera, use la cera que le dimos y colóquela sobre los tirantes que parecen estar causando el problema. La cera se mantendra en su lugar incluso mientras come si se asegura de que el área está seca antes de poner la cera en su lugar. Sacar un pedazo pequeño, lo enrolla para arriba en una pequeña bola y lo pega encima de los apoyos.

¿Todavía tengo que ver a mi Dentista para limpiezas y Chequeos?

Sí, Sí, Sí, continúe consultando a su dentista para las limpiezas regulares. Nos gustaria verle ir al menos cada seis meses para mantenerse encima de las cosas. **Esto es muy importante.** Si su dentista prefiere, nos gustaria coordinar su cita de limpieza con una visita ortodontica para que podamos quitar sus cables para las limpiezas. Esto hace que el trabajo higienistas mucho mas facil. Si usted hace una cita de limpieza, por favor haganos saber con antelacion (al menos 6 semanas) para que podamos coordinar citas con ambas oficinas. ¡Gracias!

¿Por que conseguí este espacio entre mis dientes frontales?

A veces las cosas parecen peores antes de que se vean mejor. Los dientes se moveran en diferentes direcciones a medida que los dientes se enderezan. Usted puede ver un espacio entre sus dos dientes delanteros que nunca estaba allí antes o los dientes que parecían perfectamente rectos antes de que los frenitos fueran colocados pueden no parecer tan rectos. Ese espacio se cerrara y esos dientes se alinearan, lo prometo. Con el fin de enderezar lo peor de los dientes, los dientes mas rectos se pueden sacar de la alineacion, pero finalmente todos ellos trabajan juntos para darle esa gran sonrisa que estamos trabajando hacia.

¿Yo estaba comiendo pure de papas cuando el aparato se me rompió?

A veces los frenos no se rompen inmediatamente despues de que se aflojan. A veces ese dulce caramelo duro, bagel, o corteza de pizza debilita el pegamento, pero no lo suficiente para que se desprenda. La cosa siguiente que usted sabe que el soporte aparece mientras que usted se esta sentando en clase o que come el pan blanco. Lo importante es que nos llame lo antes posible para hacer nos saber (no es necesario en lo fines de semana, ja, ja). Los aparatos no necesariamente tienen que ser reemplazados de inmediato, pero queremos saberlo, incluso si deja un mensaje. Si usted espera hasta el dia de su cita para decirnos que tiene una frenito quebrado no podemos arreglarlo. Si sabemos con antelacion que podemos hacer arreglos.

My Teeth Are Loose. Is This Okay. Are They Going to Fall out?

Yes, this is all right so do not worry about them falling out, unless it is a baby tooth of course. We want them to get loose so that we can move them around. If they get too loose we will let you know but this is rare. Most people notice this after they have been hit with an elbow, basketball or some form of trauma to the mouth. By the way, no charge for the extraction should a permanent tooth fall out (just kidding).

How Much Longer Will the Braces Be On?

Remember, the time we told you is a rough estimate. it could take a little longer or it may not take as long. A lot of what happens depends on you. If you do not wear the elastics, plan on adding time. If you like to chew gum, plan on adding time. If you miss some appointments, plan on adding time. If you continuously break braces, plan on adding time. If you go away for the summer, plan on adding time. Even if all goes smoothly, it could take a while longer. No two people have teeth that move the same way and we do not want to rush the final result. Asking at each visit, "How much longer" will not help you get your braces off any earlier. But, no one can blame you for trying! Downside to asking at every visit, your orthodontist could lose his mind which could add time (just kidding, or am I?). Good luck!

The Official NO EATS list

Gum

Bubblegum
Bubble gum
Trident
Freedent

Taffy

Laffy Taffy
Airheads
Starbursts
JuJu Beads
Gummy bears
Now and Later
Jellybeans
Licorice
Rocks
Gummy savers

Caramels

Kraft caramels
Caramel Apples
Tootsie Rolls
Raisins
Sugar Daddles
Marathon Bars
Snickers
Milk Duds

Hard Things

Ice
Pens and Pencils
Whole apples
Whole carrots
Celery Stalks
Popcorn Seeds
Hard Pretzels
Hard taco shells
Nuts of all kinds
Hard Bagels
Pizza Crust (edges)

In addition to all of the above comes the group called SWEETS. Sweets can be eaten but it is very important that you brush or rinse your mouth **immediately** after eating them. The sweets will not cause damage to your braces but they will cause damage to your teeth. This is how you get those white spots on your teeth while wearing braces. The worst of all the sweets are the soft drinks (Coke, Pepsi, etc.). It does not matter if the soft drink is diet or not, it will have the same effect on your teeth. We ask that you **please** try to **stay away from soft drinks during your Treatment.**

Should you have a brace come loose before an appointment, **please call the same day that you find out that it is broken.** We are not going to be upset with you but we do want to make sure that we have enough time to fix it during your regularly scheduled appointment. Some broken brackets can wait to be fixed while others need to be repaired as soon as possible.

The last thing that we would like you to know is that when you **bend your wires or knock a brace loose** you run the risk of making your **treatment take longer.** If you **chew gum** before Dr. McKinney tells you that it is permitted, you may dislodge your initial wires, which are very flimsy, which means the **treatment will take longer.** If you cheat, you will only be cheating yourself in the end. Just remember these things from the start and you should finish your treatment on time.

We all want this to be a positive experience for you and we want to get the job done as quickly as we possibly can. This will only happen with your cooperation. Let's work together to give you the best possible smile in the shortest period of time.

WE ARE VERY HAPPY THAT YOU HAVE CHOSEN US TO ASSIST YOU IN CREATING A FANTASTIC SMILE!

Políticas y Procedimientos de Seguro

McKinney Orthodontics proporcionará dos servicios relacionados con su póliza de seguro.

1. Verificamos los beneficios de la póliza de seguro y le enviamos esta información como se nos ha dicho en el momento de su examen. Esta información es tan precisa como el representante con el que hablamos.
2. Presentaremos las reclamaciones apropiadas como se indica en su póliza. No somos responsables de pago / no pago de su compañía de seguros. Si la compañía de seguros se convierte en delinciente de 60 días, usted será responsable de la cantidad delinciente y será reembolsado si y cuando la compañía de seguros hace el pago.

No tenemos control sobre su contrato con su compañía de seguros. Si su compañía de seguros no cumple con su obligación por cualquier razón, el asegurado es responsable y debe contactar a la compañía de seguros para resolver el problema. Los pagos adicionales enviados más adelante por su compañía de seguros le serán devueltos si su cuenta ha sido pagada.

***** En resumen, verificaremos los beneficios y presentaremos las reclamaciones solamente. Cualquier otra interacción y conflicto debe ser resuelto por usted, titular de la póliza.*****

Inicial: _____

Ayúdanos a enseñar y a aprender!

En algunos casos, es útil mostrar los resultados de los casos, en forma de fotografías y / o radiografías dentales (radiografías). Por favor firme abajo para autorizar al Dr. Jeremy McKinney a mostrar los resultados de estos casos en reuniones y revisiones científicas, o en el sitio web de McKinney Ortho y en el área de recepción.

Firma de el responsable: _____ **Fecha:** _____



CLEAR ALIGNER THERAPY INFORMED CONSENT

Benefits

- Clear aligners offer an esthetic alternative to conventional braces for tooth movement.
- Aligners are nearly invisible so many people won't realize you are in treatment.
- Aligners allow for normal brushing and flossing tasks that are generally impaired by conventional braces.
- Aligners do not have the metal wires or brackets associated with conventional braces.

Risks and Inconveniences

Like other orthodontic treatments, the use of clear aligner products may involve some of the risks outlined below:

- Clear aligners are capable of producing minor to moderate movement of the teeth. They are not designed to correct major bite problems or close large spaces.
- **Failure to wear the appliances for the required number of hours per day (22 hours), not using the products and/or not using elastics as directed by your doctor, missing appointments, and atypically shaped teeth can lengthen the treatment time and affect the ability to achieve the desired results.**
- **Failure to wear the appliances as prescribed may also allow dental relapse or other unwanted movements that require a rescan and restarting the process, which can lead to increased treatment time and additional costs. DO NOT stop wearing aligners until speaking with Dr. McKinney.**
- Dental tenderness may be experienced after switching to the next aligner in the series;
- Gums, cheeks and lips may be scratched or irritated.
- Teeth may shift position after treatment. Faithful retainer wear at the end of treatment should reduce this issue.
- Tooth decay, periodontal disease, inflammation of the gums or permanent markings (e.g. decalcification) may occur if patients consume foods or beverages containing sugar, do not brush and floss their teeth properly before wearing the clear aligner, or do not use proper oral hygiene and preventative maintenance.
- The aligners may temporarily affect speech and may result in a lisp, although any speech impediment caused by the clear aligner should disappear within one or two weeks.
- Aligners may cause a temporary increase in salivation or mouth dryness, certain medications may exacerbate.
- Teeth may require interproximal reduction (or slenderizing) to create space to allow tooth movement.
- General medical conditions and use of medications can affect orthodontic treatment.
- Health of the bone and gums which support the teeth may be impaired or aggravated.
- A tooth that has been previously traumatized, or significantly restored may be aggravated. In rare instances the useful life of the tooth may be reduced, the tooth may require additional dental treatment such as endodontic and/or additional restorative work and the tooth may be lost.
- Existing dental restorations (e.g. crowns) may become dislodged and require re-cementation or in some instances, replacement.
- NEVER eat or drink (other than water) with aligners inserted. Severe damage and decay will occur.
- Aligner breakage has a higher probability in cases with multiple missing teeth.
- In rare instances, problems may also occur in the jaw joint, causing joint pain, headaches or ear problems.
- Allergic reactions may occur.
- Teeth that are not at least partially covered by the aligner may move in an unplanned way.
- **You will have attachments on your teeth (tooth colored bumps) to aid in tooth movement. These will be removed at the end of treatment.**

*Switching to conventional braces or needing to make new appliances due to non compliance will incur additional costs.

Patient/ Legal Guardian Date:

PRINT name

Doctor /Witness Date: